

Tenibest[®] suspensión oral

Albendazol, Praziquantel
Suspensión Oral

Antiparasito interno para tratar las helmintiasis y las
teniasis de los perros



COMPOSICIÓN:

Cada mL de suspensión contiene:

Albendazole micronizado.....150 mg
Praziquantel.....12,5 mg
Excipientes c.s.p.....1 mL

DESCRIPCIÓN:

Tenibest[®] Suspensión Oral es la asociación de un antihelmíntico y tenicida de amplio espectro, y un tenicida específico muy activo, formulados con excipientes que le permiten una rápida y fácil distribución en el organismo de perros, combatiendo con eficacia y seguridad el parasitismo gastrointestinal y pulmonar, en sus formas adultas y larvares.

MECANISMO DE ACCIÓN DEL ALBENDAZOL:

El Albendazol inhibe la polimerización de la tubulina, a la enzima fumarato reductasa que produce la deficiencia en la generación de energía mitocondrial en forma de trifosfato de adenosina, ocasionando la muerte del parásito.

El Prazicuantel bloquea la síntesis de trifosfato de adenosina, modificando el tegumento del parásito, ocasionando vacuolización localizada e irreversible. Se afecta el flujo de elementos por los canales iónicos, ocasionando un aumento en la fagocitosis y la consecuente lisis del parásito.

Se absorbe por el intestino y se distribuye por todo el organismo, metabolizándose en hígado y excretándose por bilis en forma de metabolitos activos.

INDICACIONES:

Tenibest® Suspensión Oral está indicado en caninos para el control y tratamiento del parasitismo gastrointestinal producido por: *Toxocara sp.*, *Ancylostoma caninum*, *Trichuris vulpis*, *Taenia sp.*, *Uncinaria sp.*, *Dipylidium caninum*.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:

Debe administrarse por Vía Oral.

Albendazole: 30mg/k.p.v. **Praziquantel:** 2,5mg/k.p.v. ó 1mL del producto por cada 5k.p.v. preferiblemente en la mañana antes de recibir alimento.

En tricuriasis severas repetir la medicación a las 24 horas o según aconseje el Médico Veterinario.

Para el tratamiento del parasitismo por *Toxocara canis* y *Ancylostoma caninum*, la dosis de Albendazole debe ser de 50mg/k.p.v. ó 1mL por cada 3k.p.v.

PRECAUCIONES:

No debe administrarse en animales gestantes (efecto teratogénico y embriotóxico). Los metabolitos de los carbamatos han sido caracterizados como embriotóxicos y no debe utilizarse en hembras gestantes, sobre todo en el primer tercio de la gestación, o se recomienda aplicar en hembras antes de la monta o después del primer tercio de gestación (a criterio del Médico Veterinario).

Se pueden presentar efectos adversos graves como pancitopenia.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Consérvese en lugar fresco y protegido de la luz.

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.

PRESENTACIONES: **Tenibest® Suspensión Oral** viene en jeringas por 2mL, 5mL y 10mL.

Registro ICA No. 4045-DB

Registro Ecuador No. 3A1-2-8040-AGROCALIDAD

Registro Panamá No. RF-1846-11

Registro Honduras No. PF-4660

Registro Guatemala No. CO331-42-10-3049

Registro Belice No Co-42-10-941

Mayor información a solicitud del Médico Veterinario.



Tenibest® Suspensión Oral es marca registrada autorizada a Laboratorios Callbest Ltda.
Fabricado por Laboratorios Veterland Ltda., para Laboratorios Callbest Ltda.
Directora Técnica: Rosa Acosta O. Q.F.U.N.
Cra. 19 B No. 168 - 16 Bogotá D.C. - Colombia.
PBX (57-1) 6789851
contacto@laboratorioscallbest.com

